



Let op: Deze richtlijn is geldig op de datum van afdruk. Raadpleeg steeds de meest recente versie via het officiële platform op de NfN website

PDF gemaakt op: 06-05-26 15:50

Initiatiefnemer: NfN

Autorisatiedatum: 2024-11-01

Geautoriseerd door:

Richtlijninformatie

Verantwoording

Onderwerp

Per jaar falen er in Nederland gemiddeld 200-250 niertransplantaten. Slechts 13% is binnen 1 jaar opnieuw getransplanteerd. Dit maakt dat een aanzienlijk deel van deze patiënten voor korte of langere tijd zullen moeten dialyseren. Daarnaast hebben gemiddeld 350 niertransplantatie patiënten per jaar in Nederland het stadium van CKD 4-5 bereikt of nooit een goede transplantaatfunctie gehad.

Transplantaatfalen gaat gepaard met een hogere mortaliteit en morbiditeit vergeleken met andere chronisch nierfalen patiënten en er spelen een aantal specifieke onderwerpen die aandacht behoeven, waaronder:

- oorzaak en behandelen van transplantaatfalen
- het wel of niet continueren van immunosuppressieve medicatie
- voorbereiding op, timing en keuze van nierfunctie vervangende therapie
- het wel of niet verwijderen van het transplantaat

[LONT richtlijn transplantaatfalen](#)

Samenvatting

Algemeen

Bijlagen



[LONT-richtlijn-transplantaatfalen-1 \(518 KB\) ↓ 0](#)